

REACÇÕES ADVERSAS CUTÂNEAS

ERUPÇÕES ACNEIFORMES

DESCRIÇÃO

Os fármacos podem condicionar o agravamento de acne pré-existente, ou o desenvolvimento de lesões acneiformes monomórficas do tipo papulares e pustulares (geralmente não inclui comedões).

As erupções cutâneas iatrogénicas podem surgir em áreas atípicas como os membros.



Figura 1 Erupção acneiforme induzida por corticosteróides.

Retirado de DermAtlas, disponível em <http://dermatlas.med.jhmi.edu/derm/IndexDisplay.cfm?ImageID=-315577184>

MECANISMO FISIOPATOLÓGICO

Mecanismo fisiopatológico desconhecido.

CONTEÚDO	
DESCRIÇÃO	27
MECANISMO FISIOPATOLÓGICO	27
TEMPO DE LATÊNCIA	28
TRATAMENTO	28
REGRESSÃO	28
OBSERVAÇÕES	28
BIBLIOGRAFIA	29

TEMPO DE LATÊNCIA

Tempo de latência variável.

EXEMPLOS DE FÁRMACOS ENVOLVIDOS

- CONTRACEPTIVOS ORAIS
- CORTICOSTERÓIDES
- FENITOÍNA
- LÍCIO

TRATAMENTO

- ◇ Suspensão do fármaco indutor; tinoína tópica pode estar indicada.
- ◇ Em situações em que o fármaco subjacente não pode ser suspenso, a tre-

REGRESSÃO

Pode levar semanas ou meses a regredir após a suspensão do fármaco.

“geralmente não inclui comedões”

OBSERVAÇÕES

Não afecta crianças do estado pré-hormonal. na pré-puberdade, o que indica o importante papel

Autores

Maria Augusta Soares, Professora na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e Coordenadora da Unidade de Farmacovigilância do Sul

Dúnia Santos, Técnica de Farmacovigilância da Unidade de Farmacovigilância do Sul

Agradecimentos

Manuel Caneira, Professor Convidado na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa

Paulo Manuel Leal Filipe, Professor na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
Unidade de Farmacovigilância do Norte

DISPONÍVEL ONLINE ATRAVÉS DOS SITES:

ufs.ff.ul.pt

ufn.med.up.pt

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

1. Lee, A. Adverse drug reactions. London: Pharmaceutical Press; 2001.
2. Wolff, K. Goldsmith, L. Katz, S. Gilchrest, B. Paller, A. Leffell, D. Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine. 2nd ed. NY: McGraw-Hill; 2001.